

Giải pháp phá thai 14 ngày tuổi không đau

Có bầu là thiên chức, là niềm hạnh phúc của người phụ nữ. Thế nhưng, một số trường hợp việc mang thai là ngoài mong chờ và chính phụ nữ có bầu cũng không có đủ sự tự tin để giữ & sinh đứa trẻ ra. Trong nội dung bài viết này, tác giả sẽ cung cấp một số thông tin có ích về cách kết thúc thai kỳ 2 tuần tuổi để đảm bảo an toàn nhất cho bà bầu.

Thai nhi 2 tuần tuổi có phá được không?

Thai nhi 14 ngày tuổi vẫn chưa làm tổ trong buồng tử cung của phụ nữ có bầu, mà vẫn còn trong quá trình đi lại từ ống dẫn trứng đến dạ con. Khi đó, thai có kích cỡ cực kỳ nhỏ, chỉ cỡ một hạt đỗ, & không có hình dạng định vị. Điều ấy cũng có nghĩa những cơ quan trên thân thể vẫn chưa trông thấy.

Tuy nhiên, đây cũng chủ yếu là trở ngại khi các bạn muốn kết thúc thai kỳ 2 tuần tuổi. Bởi lẽ, những cách phá thai an toàn tại thời điểm này chỉ ứng dụng khi thai đã làm tổ trong buồng dạ con. Bởi vì thế, để biết chắc chắn thai 14 ngày tuổi có phá được hay không, những nữ giới nên tìm đến những địa điểm khám bệnh chất lượng cao, thực hiện siêu âm để biết chính xác tuổi thai và vị trí mà thai đang làm tổ. Những người mẹ không nên trì hoãn việc xét nghiệm sớm, vì trong trường hợp để thai quá 3 tháng tuổi thì việc phá thai sẽ trở lên nguy hại & lưu lại nhiều di chứng với bà bầu.



Phương pháp nạo phá thai 14 ngày tuổi an toàn, đúng như chỉ dẫn

Đình chỉ thai kỳ 2 tuần tuổi nội khoa

Bào thai kích cỡ nhỏ như thai 14 ngày tuổi, phương pháp nạo phá thai an toàn đặc biệt sử dụng thuốc bỏ thai. Đây là loại thuốc sử dụng cộng tác hai hợp chất là Mifepristone và Misoprostol để nạo phá

thai. Mifepristone làm cho thai ngừng phát triển, còn Misoprostol làm tăng co thắt tử cung để tống thai ra bên ngoài. Đây là phương pháp có hiệu quả cao, tỉ lệ thu được thành quả tốt từ 96% - 98%. Nhưng mà, để tiến hành được biện pháp này hữu hiệu nhất, bào thai và người mẹ phải cung ứng được đầy đủ một số yếu tố sau đây:

- Thai nhi không quá 7 tuần & thai nghén đã làm tổ trong buồng dạ con, kích thước của bào thai không to quá 2.5 cm. Thai 14 ngày tuổi khả năng hiện đang trong quá trình đi đứng ở vòi trứng, bởi vì thế chỉ sử dụng thuốc để kết thúc thai kỳ trong trường hợp chắc nịch thai đã làm tổ trong buồng tử cung qua siêu âm.
- Thai phụ có sức khỏe ổn định, không mắc một số bệnh nền như suy gan, yếu thận, hen suyễn, tăng đông hoặc giảm đông máu.
- Bà bầu chưa có tiểu sử dị ứng với một số thành phần, hoặc một số đối tượng không khác gì trong thuốc tránh thai.

Liệu trình bỏ thai 14 ngày tuổi bằng thuốc:

1. Người mẹ được khám sức khỏe khái quát bởi các bác sĩ đầu ngành để đảm bảo không bị mắc những bệnh về máu, suy gan, yếu thận hay bị phản ứng với đối tượng trong thuốc ngừa thai dự kiến sử dụng.
2. Một số bác sĩ thực hiện siêu âm để thăm khám xem thai nhi đã ở trong tử cung & đạt được một số tiêu chuẩn nêu trên hay chưa?
3. Chuyên gia sẽ cho thai phụ uống viên thuốc thứ nhất. Viên thuốc này sẽ khiến cho thai nhi ngừng tiến triển, & bong róc khỏi thành dạ con. Sau thời điểm uống, phụ nữ có bầu sẽ được quan sát xem có lạ thường gì xảy ra không, nếu như không sẽ được cho ra về nghỉ ngơi.
4. Sau khoảng 48 giờ tĩnh dưỡng ngay tại nhà, phụ nữ có bầu sẽ quay lại cơ sở y tế trước kia để khám bệnh và sử dụng viên thuốc thứ hai. Viên thuốc này có lợi ích làm tăng cường sự co bóp tử cung giúp bào thai dễ dàng được đẩy ra phía ngoài hơn. Do đó, mẹ bầu sẽ thấy phần bụng dưới đau quặn.
5. Sau khi sử dụng viên thuốc thứ 2, phụ nữ mang thai sẽ được bảo quản trung tâm y tế để quan sát khoảng 4 giờ & cứ ba mươi phút một số chuyên gia sẽ đo nhịp tim, huyết áp một lần. Trong trường hợp khoảng thời gian này không có gì bất thường, phụ nữ có bầu có thể ra về.

Trong giai đoạn 10 ngày sau khi sử dụng thuốc, đa số người có bệnh sẽ thấy bụng đau và ra nhiều máu, máu sẽ vón thành cục, mảng và được đẩy ra bên ngoài. Có những trường hợp, lượng máu khả năng ra ít hơn, tuy vậy kéo dài khoảng 4 tuần.

<https://phathaithaiha.webflow.io/post/cach-pha-thai-2-tuan-tuoi-an-toan-khong-dau>

Đình chỉ thai kỳ 14 ngày tuổi bằng biện pháp hút thai

Nếu như thai nhi đã làm tổ trong buồng tử cung và cách uống thuốc phá thai không thành công, bác sĩ khả năng chọn lựa phương pháp phá thai khác cũng an toàn là hút thai. Giải pháp này thường ứng dụng khi thai nghén từ 6 đến 12 tuần tuổi. Tuy nhiên với thai nghén 2 tuần tuổi đã làm tổ trong dạ con thì một số chuyên gia cũng có thể chọn ra để phá thai.

Giải pháp này cho tỉ lệ thành công cao, khoảng 98% những tình huống, & thời điểm tiến hành chỉ từ 10 đến 15 phút. Phác đồ chọc hút thai gồm liệu trình sau:

- Thai phụ đến trung tâm chăm sóc sức khỏe và được những chuyên gia thực hiện thăm khám sức khỏe tổng quan, tuổi thai, khu vực & độ bám của thai nghén vào buồng dạ con.
- Sau thời điểm đủ điều kiện về sức khỏe thể chất, chuyên gia sẽ tiến hành gây tê tại chỗ hoặc gây nên mê cho bà bầu. Một ống nano siêu dẫn với độ đàn hồi cao sẽ được một số bác sĩ chọc

qua "cô bé" vào buồng dạ con. Quá trình này sẽ được xem xét trên màn hình và thai nhi sẽ được hút sạch tất cả.

Hút thai ở đâu <https://phathaihaiha.webflow.io/post/co-so-pha-thai-an-toan-o-ha-noi>

Chi phí hút thai <https://phathaihaiha.webflow.io/post/pha-thai-1-thang-tuoi-bang-thuoc-va-chi-phi>

Nạo phá thai 14 ngày tuổi nguy hiểm không?

Cho dù kết thúc thai kỳ 14 ngày tuổi nội khoa hay bằng giải pháp hút chân không đều khá an toàn, tuy nhiên vẫn còn một tỷ lệ nhỏ những bà bầu bị tác động không tốt về sức khỏe thể chất.

Một vài tình trạng khả năng gặp phải khi phá thai 14 ngày nội khoa:

- Kích ứng với thuốc phá thai: một số phụ nữ có bầu có thể trạng nhạy cảm với một số đối tượng trong thuốc tránh thai, gây một số trạng thái kích ứng, phản vệ với những biểu hiện như mẩn ngứa, nổi mề đay, khó thở, choáng váng, áp huyết thấp.
- Nôn ói, nôn hoặc "đi tháo": Vì thuốc phá thai làm tăng một số cơn co thắt tử cung, nên cũng làm tăng cơn bóp bao tử - ruột. Thai phụ sẽ cảm nhận đau quặn khu vực bụng, nôn ói, nôn & tiêu chảy. Trong có những trường hợp, thầy thuốc chuyên khoa có thể kê thêm những thuốc giảm đau như paracetamol, ibuprofen để làm dịu những đau đớn. Ngoài ra, thai phụ khả năng sử dụng một chai nước nóng hoặc khăn ấm để chườm lên khu vực bụng.
- Cơn đau ở đầu, choáng váng & sốt trong vài giờ đầu: nếu như vậy, phụ nữ mang thai nên uống nhiều nước hoặc nước hoa quả, hoàn toàn không nên cà phê hoặc đồ uống có cồn, có thể sử dụng thêm thuốc giảm đau, hạ sốt như paracetamol khi cần phải. Một số dấu hiệu này thường sẽ thuyên giảm và mất đi mà không gây nên hậu quả cho người mẹ.
- Những bệnh bội nhiễm phụ sản: dù là phá thai bằng thuốc không gây tác động trực tiếp vùng tam giác mật, song đặc tính của thuốc bỏ thai có thể làm thay đổi PH và cấu trúc của một số phần mềm. Trong trường hợp người phụ nữ không rửa vùng "tam giác mật" thật sạch thì sẽ có nguy cơ mắc một số bệnh viêm phụ khoa.
- Thai nhi vẫn đang sau thời điểm sử dụng thuốc: nguyên nhân của trạng thái này là dùng thuốc sai phác đồ và không nên kiểm tra lại sau khi hết quy trình. Để tránh điều này, người mẹ cần lựa chọn một vài cơ sở y tế & những bác sĩ có đáng tin cậy, tiến hành siêu âm tử cung để chắc chắn thai đã được bài tiết tuyệt đối.

Một vài diễn biến xấu có thể mắc phải khi đình chỉ thai nghén 2 tuần bằng hút chân không:

- Nguyên nhân sử dụng dụng cụ tác động trực tiếp vào tử cung nên nguy cơ bội nhiễm là rất cao. Vào thời gian này một số bác sĩ chuyên khoa cần kê cho bà bầu một liệu trình thuốc antibiotic hợp lý.
- Ra máu nhiều gây ra suy yếu cơ thể, hoa mắt, choáng váng. Trường hợp này người mẹ cần được tĩnh dưỡng, bù đắp sắt & những vitamin toàn bộ.
- Sốt thai, vẫn đang sốt lại rau & thai trong dạ con.
- Thủng hoặc vết thương tử cung
- Đính buồng dạ con

Chat lương phong kham Thai Ha <https://phongkhamthaiha.org>

Pk Thái Hà <https://phathaihaiha.webflow.io/post/phong-kham-da-khoa-thai-ha>

Những lưu tâm khi kết thúc thai kỳ 2 tuần tuổi

Tại thời điểm này có một vài cách đình chỉ thai nghén an toàn và đạt hiệu quả tương đối cao, việc nạo phá thai 14 ngày tuổi vẫn tiềm ẩn một số rủi ro với sức khỏe thể chất của phụ nữ có bầu. Để tránh khỏi những di chứng có thể gặp phải, mẹ bầu cần có một số chú ý như sau:

- Không tùy tiện kết thúc thai kỳ ngay tại nhà hay tại một số trung tâm chăm sóc sức khỏe không tin cậy. Phụ nữ có bầu cần lựa chọn những thầy thuốc chuyên khoa phụ khoa giàu kinh nghiệm và tuyệt đối tuân thủ theo lời dặn dò hay lộ trình chữa của họ.
- Sau thời điểm bỏ thai, người bệnh cần tĩnh dưỡng, bổ sung một số chất dinh dưỡng & vitamin thiết yếu để cơ thể mau hồi phục.
- Rửa ráy bộ phận sinh dục sạch sẽ. Nếu như thấy vùng háng có triệu chứng của viêm nhiễm, rong kinh thì cần phải đi đến bác sĩ khám để được điều trị ngay từ giai đoạn đầu.
- Sau thời điểm đình chỉ thai nghén, nữ giới nên không quan hệ tình dục ít nhất là 2 tuần.